

12 ноября —

**Всемирный день
борьбы с пневмонией**

Бактерии,
вирусы



Нормальная
альвеола



Закупоренная
альвеола



Пневмония – это тяжелая легочная инфекция, обычно вызванная бактериями или вирусом.

Пневмококк является наиболее частой причиной бактериальной пневмонии.



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА от пневмококковой инфекции и гриппа достоверно уменьшает риск пневмонии и её тяжелых осложнений.

Вакцинация признана наиболее эффективным методом предупреждения пневмококковой инфекции.


- **ИММУНИЗАЦИЯ** против ПИ проводится в течение всего года.
- **ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ** вакцинацию против пневмококковой инфекции и гриппа перед началом сезона гриппа и ОРВИ одновременно (в один день)
- **ЕСЛИ** не удалось привиться в один день, то интервал между двумя прививками составляет 1 месяц.



Заболееаемость пневмонией
повышается в период эпидемии
ГРИППА И КОРОНАВИРУСА

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НЕОБХОДИМА ЛИЦАМ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА ИЗ ГРУПП РИСКА:

- **Дети** до 5 лет
- **Призывники**
- **Люди** с хроническими бронхо-легочными заболеваниями
- **Люди** с другими хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, печени, почек, сахарный диабет)
- **Пациенты** с иммунодефицитом (ВИЧ, онкология и др.)
- **Курильщики**
- **Пожилые люди** старше 65 лет



Перед вакцинацией требуется консультация терапевта

По каким симптомам можно заподозрить пневмонию у детей?

- **Дети первого месяца жизни** – слабое сосание, раздражительность, частое дыхание, втяжения между ребрами грудной клетки при дыхании, «кряхтящее» дыхание, цианоз! кашель отмечается редко
- **Дети 1-3 лет и дошкольники** – лихорадка, кашель, учащенное неглубокое дыхание, может быть рвота (в том числе на фоне кашля)
- **Дети школьного возраста и подростки** – лихорадка, кашель, боли в грудной клетке, плохое самочувствие. Могут быть боли в животе.



Пневмония редко бывает самостоятельным заболеванием, чаще всего она развивается на фоне бронхита, ОРЗ, гриппа, заболеваний горла

По каким симптомам можно заподозрить пневмонию у взрослых?

- **Острый кашель, одышка, отделение мокроты** и/или боли в грудной клетке, связанные с дыханием, которые в большинстве случаев сопровождаются лихорадкой
- **Слабость, утомляемость**, ознобы, сильное потоотделение по ночам
- **Развитию пневмонии** может предшествовать ОРЗ или острый бронхит
- **У лиц пожилого и старческого возраста:** сонливость или беспокойство, спутанность сознания, отказ от еды, тошнота, рвота или ухудшение состояния по основному заболеванию (сахарный диабет, сердечная недостаточность и др.). Типичные жалобы могут отсутствовать.





Поставить диагноз
«ПНЕВМОНИЯ»

может только
врач!